Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

Kad bērnam jāpaliek mājās?

Ja novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm
(*visām pazīmēm jābūt **AKŪTĀM**, neattiecas uz hroniskas slimības paasinājumu*)

Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,0°C vienlaikus ar citām pazīmēm **VAI 37,4°C un vairāk** bez citām pazīmēm

Sauss klepus, sāpes kaklā

Nav saistīts ar hronisku slimību

Garšas un ožas traucējumi vai zudums

Ja tas nav aizlikta deguna dēļ

Izteiktas iesnas (aizlikts deguns, izdalījumi no deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena sajūta deguna apvidū un pierē**) VAI**
ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz **37,5°C** bez citām slimības pazīmēm **VAI**
stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja (retāk sastopamas Covid-19 pazīmes)

Vecāki sazinās ar ģimenes ārstu telefoniski un pilda ārsta norādījumus

Testēšanas uz Covid-19 infekciju nepieciešamība (nosaka ārsts)

ir

nav

Rezultāts pozitīvs

Izolācija līdz ģimenes ārsta lēmumam par tās izbeigšanu

Rezultāts negatīvs

Nav iespējams veikt

Izolācijā mājās vismaz 14 dienas

Ģimenes ārsts pieņem lēmumu par mājas izolācijas izbeigšanu

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar ārsta izziņu (veidlapa 027/u)

Bērns paliek mājās novērošanā līdz 72 stundām
Konsultācija ar ģimenes ārstu telefoniski nepieciešamības gadījumā

Bērna veselības stāvoklis pasliktinājies, parādījušās citas pazīmes

Bērnam vairs nav infekcijas slimības pazīmju, vismaz 24 stundas nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras, nelietojot temperatūru pazeminošus līdzekļus, joprojām var būt nedaudz izdalījumu no deguna, bērns jūtas apmierinoši

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku attaisnojumu